

Вибірковий компонент
Імунопрофілактика інфекційних
захворювань



Характеристика ВК

Кількість кредитів / годин – 3 / 90 годин

Вид контролю – залік

- **1. Імунопрофілактика:**
- 1) **активна (вакцинація)** — введення до організму відповідного антигену або антигенів мікроорганізму з метою стимулювання специфічної імунної відповіді (гуморальної та клітинної), яка захищає від інфікування або захворювання;
- 2) **пасивна** — парентеральне введення готових антитіл захисної дії;
- 3) **активно-пасивна** — поєднання вище вказаних методів;
- 4) **передекспозиційна** — проведена перед контактом із патогенним мікроорганізмом;
- 5) **постекспозиційна** — проведена після експозиції до інфекції неімунізованих осіб, у випадку хвороб із довшим інкубаційним періодом (напр., сказ, а у виняткових випадках також: правець, вірусні гепатити В або А, кір, вітряна віспа).

- **2. Вакцини**

- 1) т. зв. **живі** (містять живі, атенуйовані, тобто ослаблені та позбавлені вірулентності мікроорганізми); вакцини проти: туберкульозу (БЦЖ [BCG]), кору, паротиту, краснухи, вітряної віспи, оперізного герпесу, *поліомієліту* (пероральна — OPV), жовтої гарячки;
- 2) т. зв. **інактивовані** (містять цілі, вбиті або інактивовані мікроорганізми або їх фрагменти — вибрані антигени або анатоксини); вакцини проти: дифтерії, правця, кашлюка, *Haemophilus influenzae* типу b, пневмококів, менінгококів, черевного тифу, грипу (тривалентна, інактивована [TIV]), вірусного гепатиту типу А і В, сказу, поліомієліту (парентеральна — IPV), кліщового енцефаліту, ВПЛ [HPV];
- 3) **обов'язкові** (для дітей та молоді або осіб, особливо наражених на ризик інфікування); лікар юридично зобов'язаний передати кожному пацієнту, який відповідає критеріям, повну та вірогідну інформацію про можливості вакцинації (користь, ризик побічних реакцій, ризик, пов'язаний з відмовою від вакцинації) та безоплатне виконання вакцинації;
- 4) **рекомендовані** — рекомендовані для конкретних груп пацієнтів; лікар юридично зобов'язаний передати кожному пацієнту, який відповідає критеріям, повну інформацію про можливості вакцинації (користь, ризик побічних реакцій, ризик, пов'язаний з відмовою від вакцинації) та безоплатне виконання вакцинації, але вартість вакцини оплачується пацієнтом.

- **3. Поствакцинальні побічні реакції (ППР)** — кожне порушення стану здоров'я у результаті вакцинації, яке виникає протягом 4 тиж. від моменту введення вакцини (або довшого періоду після вакцинації проти туберкульозу), у зв'язку з дефектами у процесі виготовлення вакцини або порушення техніки під час проведення вакцинації, або через індивідуальну реакцію пацієнта на вакцину
 - 1) **тяжкі** — смерть або загроза життю, стан, що потребує госпіталізації або подовжує її, тривале порушення здоров'я;
 - 2) **серйозні** — досить інтенсивні, але не створюють потребу госпіталізації та не загрожують життю.
- У більшості випадків порушень стану здоров'я після вакцинації (підозри на ППР) зв'язок є випадковим (збіг обставин), а не причинно-наслідковий. Кожна підозра на ППР вимагає зголошення (→Тактика)



**Запрошуємо на
навчання!**

