

Марченко А.В., Литовченко І.Ю., Ніколішина Е.В., Іленко Н.М.

Українська медична стоматологічна академія

Кафедра терапевтичної стоматології, Полтава

ellanikolishyna@gmail.com

ЛІКУВАННЯ ГІПЕРТРОФІЧНОГО ГІНГІВІТУ У ОРТОДОНТИЧНИХ ХВОРИХ

Актуальність. У деяких пацієнтів з неякісною гігієною порожнини рота та наявністю ортодонтичної патології, внаслідок тривалої дії травмуючого фактору, може виникати гіпертрофічний гінгівіт.



На кафедрі терапевтичної стоматології розроблено спосіб лікування гінгівіту в ортодонтичних хворих.

Схема лікування

Запропонований спосіб лікування гінгівіту в ортодонтичних хворих здійснюється наступним чином.

Виконання професійної гігієни порожнини рота з послідуєчим складанням та контролем алгоритму індивідуальної гігієни, санація порожнини рота, аплікації на ясна та інстиляції в ясеневі кишені 10% розчину «Бішофіт Полтавський», щоденно, курсом 8-12 процедур.



Індивідуальна гігієна включає:

- чистку зубів органічною лікувальною зубною пастою Bisheffekt на основі бішофіту, 2 рази на день;
- застосування органічного лікувального ополіскувача ротової порожнини Bisheffekt на основі бішофіту, 2-3 рази на день, протягом 1-2 хвилин.

В комплексному лікуванні з метою нормалізації окисно-відновних процесів призначають таблетки «Тіотриазолін» внутрішньо по 100 мг 3 рази на добу, курсом 20 днів.

Препарат бальнеотерапії створений на основі природних речовин, який у своєму складі містить значну кількість солей і мікроелементів (калія, кальція, магнія, натрія, йода та ін.), має протизапальні, знеболювальні якості за рахунок проникності мікро- і макроелементів.

«Бішофіт Полтавський» - екомінерал, який у своєму складі містить значну кількість солей і мікроелементів (калія, кальція, магнія, натрія, йода та ін.), належить до протизапальних препаратів бальнеотерапії, які створені на основі природних речовин. Має протизапальні, знеболювальні якості за рахунок проникності мікро- і макроелементів крізь слизову оболонку.



«Тіотриазолін» - лікарський засіб з антиоксидантними, мембраностабілізуючим, протиішемічними властивостями, застосовується для лікування захворювань, в патогенезі яких є запалення.



Клінічний приклад лікування за запропонованим способом



Висновки. Запропонованим способом було проліковано 14 пацієнтів, віком 20-23 років, з набряковою формою гіпертрофічного гінгівіту, хронічного перебігу. Лікування пацієнтів дослідної групи вважали ефективним при досягненні позитивних результатів у клінічній картині захворювання.

Таким чином, запропонований спосіб простий у виконанні, ефективний, може використовуватись у стоматології з метою забезпечення протизапальних процесів при лікуванні гінгівіту в ортодонтичних хворих.